

### **Причины рака матки**

Наиболее достоверная гипотеза о причине карциномы эндометрия связана с устойчивым ростом эстрогенов (женских половых гормонов) без прогестерона пролонгированной секреции.

При длительном и непрерывном действии эстрогенов здоровый эндометрий подвергается гиперплазии и, если стимуляция продолжается, это может нарушить нормальный железистый эпителий. Подобные процессы обратимы и не всегда вызывают карциному. Однако после обнаружения их следует контролировать, потому что они увеличивают риск рака. Через определенный промежуток времени эпителиальная гиперплазия может стать атипичной гиперплазией, что является первым шагом на пути развития эндометриальной карциномы.

Факторы риска развития рака матки:

- Возраст более 50 лет.
- Гиперплазия эндометрия.
- Ожирение.
- Наследственность.
- Неправильное использование гормональных контрацептивов.

## **Рак эндометрия (рак матки)**

Добавил(а) Оля

11.05.22 13:51 - Последнее обновление 11.05.22 14:16

---

- Ановуляторные циклы.
- Оксислительная поликистозная патология.
- Гормональные опухоли яичников.
- Серьезные менопаузальные и менструальные проблемы.
- Внешняя среда – этот пункт в основном касается женщин в развитых странах.

### **Симптомы**

Основной симптом рака эндометрия - генитальное кровотечение в результате некроза и разрушения опухолевой массы. Избыточное кровотечение из влагалища происходит во время или вне месячных - гиперменорея, метроррагия и меноррагия. Консистенция кровавой жидкости может меняться - она обычно содержит сгустки, куски опухолевой массы, но также может быть похожа на «куски мяса», что более характерно для рака шейки матки. Боль приходит намного позже, а связана она с сокращениями матки. Неприятный запах также появляется значительно позже из-за некротических изменений в опухоли.

### **Типы эндометриальной карциномы**

## **Рак эндометрия (рак матки)**

Добавил(а) Оля

11.05.22 13:51 - Последнее обновление 11.05.22 14:16

---

При гистологическом исследовании выявляются:

- Аденокарцинома – самый распространенный рак тела матки с благоприятным прогнозом.
- Папиллярная серозная карцинома.
- Аденосакрезная карцинома.
- Плоскоклеточная карцинома и другие типы.

В зависимости от степени дифференциации:

- сильно дифференцированный
- с самым благоприятным прогнозом;
- умеренно дифференцированный;
- низкодифференцированный;
- анатомический – наиболее злокачественный рак.

## **Рак эндометрия (рак матки)**

Добавил(а) Оля

11.05.22 13:51 - Последнее обновление 11.05.22 14:16

---

Согласно этапам развития:

0 - карцинома *in situ*.

I - рак расположен только в теле матки.

II - рак вторгся в шейку матки.

III - рак распространился из матки в соседнее пространство.

IV - рак распространился на соседние органы.

## **Исследования и диагностика**

Анамнез и гинекологическое обследование тщательно рассматриваются специалистом. Они также являются средствами для массового скрининга женского населения. Кроме того, при профилактическом обследовании проводят трансвагинальное УЗИ, оценивающее состояние матки.

## **Рак эндометрия (рак матки)**

Добавил(а) Оля

11.05.22 13:51 - Последнее обновление 11.05.22 14:16

---

В случае сомнений используются некоторые из следующих тестов:

- высабливание;
- гистероскопия;
- рентген легких для исключения метастазов в них;
- компьютерная томография;
- ядерный магнитный резонанс.

Дифференциальный диагноз проводят с другими патологиями, которые возникают при половых кровотечениях и беременности.

## **Лечение**

Подобно лечению других злокачественных опухолей, лечение рака эндометрия проводят с осторожностью целой командой специалистов. Любая задержка или ошибка в лечении могут быть фатальными.

Лечение - прежде всего оперативное. Обычно проводится полная гистерэктомия, а при

## **Рак эндометрия (рак матки)**

Добавил(а) Оля

11.05.22 13:51 - Последнее обновление 11.05.22 14:16

---

воздействии шейки матки - аднексэктомия. Лимфатическая диссекция локальных лимфатических узлов также осуществляется при распространенном раке. Дополнительная адъювантная лучевая терапия может применяться после операции. Поскольку опухоль чувствительна к гормонам, гормональная терапия также находится на усмотрении лечащего врача. На современном этапе лечения рака эндометрия химиотерапия назначается довольно часто. Прогноз При раннем обнаружении прогноз относительно хороший. Если лечение началось на I-й стадии, 5-летняя выживаемость составляет более 90%. Для других стадий прогноз менее утешительный.

=====

Но даже с 3-4 стадией возможно продлить жизнь и улучшить качество жизни, предотвратить метастазирование. Опухоль невозможно вылечить - это необратимая мутация.

Новообразования можно только уничтожить, химио, лучевой терапиями, операбельно, либо растительными ядами, других способов на сегодняшний день мне не известно, к сожалению.

Правильно составленная схема лечения, настойки растительных ядов нужной концентрации, с соблюдением технологии приготовления, и много других нюансов - всё это очень важно для достижения результата. Многие рассчитывают на чудо, но чудес к сожалению, не бывает.

Хотя позитивный настрой пациента так же очень важен при любой терапии. Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту [Olia-78@mail.ru](mailto:Olia-78@mail.ru).

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечения настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

## **Рак эндометрия (рак матки)**

Добавил(а) Оля

11.05.22 13:51 - Последнее обновление 11.05.22 14:16

---

+7-989-750-01-99 МТС.