

Заболевание органов пищеварения - рак пищевода занимает шестое место по частоте возникновения онкологий. Чаще диагностируется у пожилых людей и характеризуется ростом опухоли на участке плоского эпителия пищевода. Рак на 1,2 стадии практически не заявляет о себе, т.к. протекает бессимптомно.

Человек не испытывает особый дискомфорт, почему и выявляются начальные стадии случайно, в ходе плановой диагностики. Если не обращаться к врачам на раннем этапе или игнорировать лечение, то заболевание перейдет в запущенную стадию и прогноз, увы, уже станет безнадежным.

Первые признаки

Ранние симптомы рака проявляются лишь тогда, когда на участке плоского эпителия пищевода образуется опухоль и начнет ускоренный рост. Постепенно проходимость пищевода снижается, развивается дисфагия или пища начинает застревать в глотке у больного. Так появляются трудности при глотании твердой пищи, чувство кома в горле, подступы тошноты и рвоты. Дополнительно пациент испытывает постоянный голод, ослабевает, теряет в весе. Развивается анемия. Язык покрывается бело-серебристым налетом. Другие неспецифические признаки 1 стадии рака: изжога; осиплость голоса; сухой кашель с отхождением мокроты с примесью крови при рвотных позывах; увеличение лимфоузлов в надключичной области; повышенное слюноотделение, т.к. опухоль по мере развития сдавливает стенки пищевода, вызывает рефлекс со стороны слюнных желез.

Внимание! Рак пищевода развивается сравнительно медленно. В связи с чем первые признаки, пусть даже и неспецифичные, должны стать поводом для обращения к врачам, прохождения диагностики.

Особенности заболевания

Первые симптомы при раке пищевода схожи с хроническим катаром слизистой. Сначала наблюдаются еле уловимые ощущения затрудненного глотания. Затем они исчезают, но

вскоре появляются вновь. Даже при приеме жидкой пищи человеку кажется, что он проглатывает ком. При этом присутствует дисфагия, ведь пищевод раздражен, спазмируется и это особенно часто бывает при язвенных и инфильтративных формах рака. На наличие патологии в пищеварительном тракте указывает повышенное слюноотделение, ведь одна из функций слюнных желез - повышение скольжения, вязкости пищи. При раке железы пытаются смыть инородные тела, застрявшие в пищеводе. Именно так, обильным отделением слюны они реагируют на воспалительный процесс или образование инородного тела в гортани.

Различают 2 основных вида рака пищевода: Аденокарцинома с локализацией новообразования в нижней части пищевода. Плоскоклеточная карцинома с поражением средних, верхних отделов органа. Степень выраженности онкологии зависит от развивающейся формы рака. Язвенная карцинома протекает медленно. Лишь спустя 8-14 месяцев у пациента появляются боли за грудиной, срыгивания, гнилостный запах изо рта. При данной форме болезни часто ставится ошибочный диагноз – кардиоспазм. Ведь на время опухоль перестает расти. Наступает явление “ложного благополучия”. Симптомы не беспокоят пациентов, и только дифференциальная диагностика поможет отличить кардиоспазм от истинного рака пищевода. Опухоль при карциноме стенозирующей формы образуется в верхней трети пищевода. Вовлекает в патологический процесс гортань и трахеи. Провоцирует такие признаки как: лающий кашель; паралич голосовой связки; увеличение надключичной железы. Пациент порой не может высунуть язык, если новообразование обволакивает надгортанник, сдавливает возвратный нерв и 2-й грудной корешок при вовлечении в патологию пограничного симпатического нерва. Стенозирующая карцинома пищевода также имеет медленное течение. Протекает по типу изжоги, боли под ложечкой после приема пищи, ощущения тяжести, срыгиваний и ведет к полной непроходимости пищевода.

Характеристики первой стадии рака и прогноз

Каждая стадия онкологии характеризуется свойственными ей физиологическими, морфологическими, клиническими особенностями. На начальной стадии новообразование локализуется в пределах верхнего эпителиального слоя пищевода. Патологические клетки пока не проникают в близлежащие лимфатические узлы и метастазы отсутствуют. Но уже опухоль может распространяться на более глубокие ткани. Опухоль пищевода имеет скрытое течение, поэтому не всегда даже инструментальные исследования позволяют выявить аномалии эпителия на начальном этапе. К сожалению, данный вид онкологии у большинства больных диагностируются поздно, на 3-4 стадии. Самый лучший прогноз (выживаемость – до 5 лет) - при аденокарциноме без метастазов. Хуже (более 5-8 месяцев жизни) - при плоскоклеточном раке, если опухоль прорастает в региональные лимфатические узлы и

Рак пищевода: ранние признаки, прогноз.

Добавил(а) Оля
19.08.22 15:41 -

близлежащие жизненно важные органы. Если новообразование распространяется на магистральные сосуды, то может вызывать профузные кровотечения, которые также чреваты смертельным исходом.

=====

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту Olia-78@mail.ru.

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.

.