

Заболевание органов пищеварения - рак пищевода занимает шестое место по частоте возникновения онкологий. Чаще диагностируется у пожилых людей и характеризуется ростом опухоли на участке плоского эпителия пищевода. Рак на 1,2 стадии практически не заявляет о себе, т.к. протекает бессимптомно.

Человек не испытывает особый дискомфорт, почему и выявляются начальные стадии случайно, в ходе плановой диагностики. Если не обращаться к врачам на раннем этапе или игнорировать лечение, то заболевание перейдет в запущенную стадию и прогноз, увы, уже станет безнадежным.

Первые признаки

Ранние симптомы рака проявляются лишь тогда, когда на участке плоского эпителия пищевода образуется опухоль и начнет ускоренный рост. Постепенно проходимость пищевода снижается, развивается дисфагия или пища начинает застревать в глотке у больного. Так появляются трудности при глотании твердой пищи, чувство кома в горле, подступы тошноты и рвоты. Дополнительно пациент испытывает постоянный голод, ослабевает, теряет в весе. Развивается анемия. Язык покрывается бело-серебристым налетом. Другие неспецифические признаки 1 стадии рака: изжога; осиплость голоса; сухой кашель с отхождением мокроты с примесями крови при рвотных позывах; увеличение лимфоузлов в надключичной области; повышенное слюноотделение, т.к. опухоль по мере развития сдавливает стенки пищевода, вызывает рефлекс со стороны слюнных желез.

Внимание! Рак пищевода развивается сравнительно медленно. В связи с чем первые признаки, пусть даже и неспецифичные, должны стать поводом для обращения к врачам, прохождения диагностики.

Особенности заболевания

Первые симптомы при раке пищевода схожи с хроническим катаром слизистой. Сначала наблюдаются еле уловимые ощущения затрудненного глотания. Затем они исчезают, но

Рак пищевода: ранние признаки, прогноз.

Добавил(а) Оля
19.08.22 15:41 -

вскоре появляются вновь. Даже при приеме жидкой пищи человеку кажется, что он проглатывает ком. При этом присутствует дисфагия, ведь пищевод раздражен, спазмируется и это особенно часто бывает при язвенных и инфильтративных формах рака. На наличие патологии в пищеварительном тракте указывает повышенное слюноотделение, ведь одна из функций слюнных желез - повышение скольжения, вязкости пищи. При раке железы пытаются смыть инородные тела, застрявшие в пищеводе. Именно так, обильным отделением слюны они реагируют на воспалительный процесс или образование инородного тела в горле.

Различают 2 основных вида рака пищевода: Аденокарцинома с локализацией новообразования в нижней части пищевода. Плоскоклеточная карцинома с поражением средних, верхних отделов органа. Степень выраженности онкологии зависит от развивающейся формы рака. Язвенная карцинома протекает медленно. Лишь спустя 8-14 месяцев у пациента появляются боли за грудиной, срыгивания, гнилостный запах изо рта. При данной форме болезни часто ставится ошибочный диагноз – кардиоспазм. Ведь на время опухоль перестает расти. Наступает явление “ложного благополучия”. Симптомы не беспокоят пациентов, и только дифференциальная диагностика поможет отличить кардиоспазм от истинного рака пищевода. Опухоль при карциноме стенозирующей формы образуется в верхней трети пищевода. Вовлекает в патологический процесс горло и гортань. Провоцирует такие признаки как: лающий кашель; паралич голосовой связки; увеличение надключичной железы. Пациент порой не может высунуть язык, если новообразование обволакивает надгортанник, сдавливает возвратный нерв и 2-й грудной корешок при вовлечении в патологию пограничного симпатического нерва. Стенозирующая карцинома пищевода также имеет медленное течение. Протекает по типу изжоги, боли под ложечкой после приема пищи, ощущения тяжести, срыгиваний и ведет к полной непроходимости пищевода.

Характеристики первой стадии рака и прогноз

Каждая стадия онкологии характеризуется свойственными ей физиологическими, морфологическими, клиническими особенностями. На начальной стадии новообразование локализуется в пределах верхнего эпителиального слоя пищевода. Патологические клетки пока не проникают в близлежащие лимфатические узлы и метастазы отсутствуют. Но уже опухоль может распространяться на более глубокие ткани. Опухоль пищевода имеет скрытое течение, поэтому не всегда даже инструментальные исследования позволяют выявить аномалии эпителия на начальном этапе. К сожалению, данный вид онкологии у большинства больных диагностируются поздно, на 3-4 стадии. Самый лучший прогноз (выживаемость – до 5 лет) - при аденокарциноме без метастазов. Хуже (более 5-8 месяцев жизни) - при плоскоклеточном раке, если опухоль прорастает в региональные лимфатические узлы и

Рак пищевода: ранние признаки, прогноз.

Добавил(а) Оля
19.08.22 15:41 -

близлежащие жизненно важные органы. Если новообразование распространяется на магистральные сосуды, то может вызывать профузные кровотечения, которые также чреваты смертельным исходом.

=====

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту Olia-78@mail.ru.

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.

.