

Рак – большая группа злокачественных новообразований, развивающихся из эпителиальных клеток различных органов и тканей. Рак желудка находится на 5 месте в общей структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями. Встречается наиболее часто в возрастной группе после 40 лет.

Основные причины заболевания. Как и любая другая онкологическая патология, рак желудка не имеет единой и четкой причины своего развития. Недуг представляет собой результат сочетания целой совокупности различных факторов, влияющих на организм в тот или иной период времени.

На данный момент ученые выделяют следующие факторы, значительно повышающие риск развития патологии:

1) Наследственная предрасположенность: для некоторых людей имеет первостепенное значение. Если у родственников первой линии было диагностировано заболевание, шанс его появления повышен примерно на 20%.

2) Неправильное питание: регулярное потребление соленых, копченых, маринованных продуктов, нитратов, недостаток в рационе овощей и фруктов.

3) Вредные привычки: по некоторым данным каждый пятый случай заболевания является следствием курения. Злоупотребление алкоголем также повышает вероятность трансформации здоровых клеток.

4) *H. Pylori*: при исследовании, у каждого второго носителя опухоли выявляется данный микроорганизм. Хеликобактер пилори является основным возбудителем хронического гастрита. Его носительство ассоциировано с хроническим воспалением в желудке, что повышает вероятность злокачественного перерождения.

К менее важным факторам относят:

- язвенная болезнь желудка; - полипоз слизистой оболочки; - перенесенные операции на желудке; - стойкие иммунодефициты; - наличие других злокачественных опухолей в анамнезе;

Первые проявления рака желудка.

Главной проблемой диагностики является то, что ранние стадии могут протекать абсолютно бессимптомно. Если симптомы и возникают, то часто больные излишне оптимистичны и считают, что это проявление менее серьезных патологий – гастрита или язвенной болезни, занимаются самолечением в домашних условиях. Первым проявлением, еще до появления местных симптомов, часто выступает так называемый “синдром малых признаков”.

Это совокупность следующих симптомов, возникающих у лиц пожилого возраста без какой-либо видимой причины: - слабость, повышенная утомляемость; - пониженный аппетит; - резкое похудение; - чувство желудочного дискомфорта; - стойкая субфебрильная температура (37-38 градусов).

Со временем начинают нарастать местные проявления опухоли: - постоянные боли в эпигастриальной области, которые усиливаются после приема пищи и не проходят даже ночью; - тошнота и рвота; - изжога; - затрудненное прохождение пищи по пищеводу (при полной обтурации просвета желудка в месте присоединения к нему пищевода больные не могут даже пить); - пальпируемое образование в эпигастриальной области.

При отсутствии лечения может возникнуть серьезное осложнение в виде желудочного кровотечения. Последнее проявляется кровавой рвотой и черным дегтеобразным стулом. Если кровотечение массивное, падает артериальное давление, развивается тахикардия, происходит потеря сознания, возможен летальный исход.

Рак желудка – очень серьезное заболевание, имеющее на поздних стадиях весьма неблагоприятный прогноз. Чем раньше будет начато лечение, тем выше шанс достичь полного излечения, поэтому при наличии вышеописанных проявлений необходимо как

Рак желудка: основные причины и первые проявления патологии

Добавил(а) Оля
24.03.23 14:06 -

можно скорее обратиться к специалисту для полноценной диагностики.

=====

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту Olia-78@mail.ru.

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.