

## **Вторая стадия рака желудка**

Добавил(а) Оля

19.02.24 17:00 - Последнее обновление 19.02.24 17:29

---

Рак желудка - опасная патология, при которой происходит злокачественная трансформация клеток органа. По частоте встречаемости рак желудка находится в тройке лидеров, чаще него встречается только рак легких.

1. Причины рака желудка Рак желудка относится к патологическим заболеваниям. Это означает, что существует множество факторов, определяющих развитие патологии, например: - наследственный фактор; - нарушения функционирования иммунной системы; - отсутствие физических нагрузок и вредные привычки; - переедание и ожирение; - хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

2. Симптомы и стадии Онкология желудка второй степени отличается яркой симптоматикой, но типичных симптомов и метастазов не наблюдается. Только такие проявления, как: - болевой синдром с тянувшими болями, реже - колющими или острыми; - изжога, икота, рвота; - постоянные ощущения тяжести и переполненности желудка.

Позже появляются общие симптомы: слабость, сонливость, апатия, повышение температуры тела. Чтобы лучше понять, что такая стадия онкологии, следует изучить стадиальность.

На первой стадии опухоль только появляется. Метастазы отсутствуют, размеры опухоли небольшие.

На второй стадии характерно прорастание опухоли глубоко в стенку желудка.

На третьей стадии образование метастазирует в регионарные лимфатические узлы.

## **Вторая стадия рака желудка**

Добавил(а) Оля

19.02.24 17:00 - Последнее обновление 19.02.24 17:29

---

Для четвертой стадии характерно образование отдаленных метастазов и прорастание опухоли в другие близлежащие анатомические образования. Это самый опасный этап.

### **3. Диагностика и лечение второй стадии рака желудка**

Диагностические мероприятия по выявлению рака желудка включают:

- Ультразвуковая диагностика желудка позволяет оценить структуру органа, выявить опухоль и оценить степень инфицирования.
- Рентген желудка с контрастом дает возможность обнаружить новообразования и провести обследование.
- МРТ/КТ-диагностика, они позволяют детально оценить состояние желудка и окружающих его структур.
- ФГДС позволяет взять ткань на биопсию, что важно для дифференциальной диагностики. Вторая стадия рака желудка лечится методом удаления опухоли (в зависимости от размера образования), лучевой терапии и химиотерапии. В комплексе эти методы дают отличные результаты.

### **4. Профилактика и прогнозы**

Второй этап рака желудка после проведенной операции дает хорошие шансы на выздоровление и долгую жизнь. Чтобы предотвратить развитие рака желудка, достаточно соблюдать несколько несложных рекомендаций: - проходить регулярные профилактические осмотры; - вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания. Следуя упомянутым советам, у человека есть шанс никогда не столкнуться с этой страшной болезнью. И болезнь легче предотвратить, чем лечить.

## **Вторая стадия рака желудка**

Добавил(а) Оля

19.02.24 17:00 - Последнее обновление 19.02.24 17:29

---

=====

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту [Olia-78@mail.ru](mailto:Olia-78@mail.ru).

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.